



Univerzita
Pardubice
Fakulta
zdravotnických studií

Posudek vedoucího závěrečné práce (bakalářská práce)

Název práce: Botulotoxin při refrakterním idiopatickém hyperaktivním močovém měchýři
Autor práce: Michaela Krejčíková
Studijní program: B5349 Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Akademický rok: 2013/2014
Typ práce: teoreticko-výzkumná

Kritéria hodnocení práce	Hodnocení					
	1	1-	2	2-	3	N
Teoretický úvod						
<i>Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu</i>	x					
<i>Členění kapitol, návaznost</i>	x					
<i>Práce s odbornou literaturou</i>	x					
<i>Rozsah</i>	x					
Metodika						
<i>Cíle práce</i>	x					
<i>Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací</i>	x					
<i>Vhodnost a správnost použitých metod</i>	x					
<i>Popis, vysvětlení použitých metod</i>	x					
Prezentace výsledků						
<i>Správnost, přesnost</i>		x				
<i>Přehlednost, jasnost</i>	x					
Diskuze						
<i>Kvalita, odborná úroveň</i>	x					
<i>Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky</i>	x					
<i>Rozsah</i>	x					
Závěr						
<i>Shrnutí zjištěných skutečností</i>	x					
<i>Dosažení stanovených cílů</i>	x					
<i>Význam pro praxi, osobní přínos</i>	x					
Formální stránka práce a spolupráce						
<i>Dodržení směrnice, manuálu</i>	x					
<i>Stylistika</i>	x					
<i>Gramatika</i>	x					
<i>Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh</i>	x					



Spolupráce

x

Případný komentář:

V bakalářské práci se studentka Michaela Krejčíková věnovala intenzivně výhodám a nevýhodám nové metody léčby hyperaktivního měchýře (botulotoxin). Teoretická část práce je stručná a odpovídá aktuálním poznatkům. Ve výzkumné části studentka zkoumala pomocí rozsáhlého dotazníku zkušenosti patientek s dosavadní léčbou anticholinergiky a jejich postoj k nové léčbě, kterou dotázané pacientky ještě nevyzkoušely. Cíle a výzkumné otázky jsou jasně formulovány, výsledky jsou prezentovány jasně a přehledně. Studentka se ve svém souboru dopracovala k již známým problémům s anticholinergiky: vysoké procento přetrvávajících příznaků hyperaktivního měchýře, zejména urgencye, vysoké procento (třetina) nespokojených patientek. Hlavním přínosem práce je vyčíslení různých kritérií, která by mohla hrát roli ve vybírání nové léčby hyperaktivního měchýře. Výsledkem práce je zjištění, že na prvním místě, co se nevýhod léčby botulotoxinem týká, je pro pacientky poměrně krátká doba účinku, na dalším místě je riziko, že se musí cévkovat. Kupodivu jim poměrně málo vadí hospitalizace a celková anestézie, i cena vadí zhruba jen polovině patientek.

V diskuzi jsou jednotlivé odpovědi na výzkumné otázky živě rozebrány a porovnány s údaji z literatury. Celá práce je psána v dobře srozumitelném a plynulém stylu.

Výsledná klasifikace

(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl)

výborně

Dne:

7.5.2015

Podpis

prim. Dr. med. Germund Hensel